

傳氏眼科審視瑤函

傅氏眼科審視瑤函方目

卷之三目錄

天行赤熱症

驅風散熱飲子
白皮散

暴風客熱症

局方洗心散
洗眼散

火脹大頭症

普濟消毒飲
住痛解毒丸

怕熱羞明症

明目細辛湯
歸葵湯
吹雲膏

瞼硬睛疼症

二朮散 煖腫膏

赤痛如邪症

十珍湯 酒調洗肝散

痛如針刺症

加減八正散

大小雷頭風症

清震湯 加味調中益氣湯 將軍定痛丸

藥枕方

左右偏頭風症

羌活芍藥湯 柴芍湯 蒼朮湯 細辛湯

吳茱萸湯 升麻芷葛湯

陰邪風症

加味柴胡湯 生熟地黃湯 驅風上清散

上清散

陽邪風症

防風羌活湯 子和搜風丸 磁石丸

瘀血灌睛症

分珠散 宣明丸

血灌瞳神症

陸血明目飲 摩挲石散 落紅散

色似胭脂症

退赤散

赤絲虬脈症

退熱散 點眼養仁膏

白澀症

桑白皮湯

白珠俱青症

天麻湯

癢如蟲行症

驅風一字散 八參羌活湯 廣大重明湯

腫脹如極症

散熱消毒飲子 金絲膏

狀若魚胞症

玄參飲 洗眼青皮湯

鵲眼凝睛症

瀉腦湯 摩風膏

旋瞤泛起症

瀉肝散 救睛丸

珠突出眶症

救睛丸 立退丸 水淋法

黃膜上衝症

通脾瀉胃湯 立應散

赤膜下垂症

皂角丸 洗眼金絲膏

凝脂翳症

四順清涼飲子

花翳白陷症

洗肝散 琥珀散

蟹睛症

防風瀉肝散 瀉肝湯

冰瑕翳症

開明丸 琥珀煎

陰陽翳症

羌活退翳散

瑪瑙內傷症

補肝丸

聚星障症

海藏地黃散

垂簾障症

天麻退翳散 捲簾散

逆順障症

羚羊角飲子

混睛障症

地黃散 七寶膏

努肉攀睛症

還睛散 吹霞散 定心丸

雞冠蜆肉症

涼膈清脾飲 翠雲錠

魚子石榴症 抽風湯 化積散

終

傅氏眼科審視瑤函卷之三

秣陵傅仁宇允科纂輯

婿張文凱廷獻叅閱

廣陵林長生聲震較補

男傅維藩國棟編集

甥張秀徵訂正

公猷 掄

大梁周靖公亮節較梓

體仁 顓 全次

運氣原證

按內經時行暴熱天氣亢和燥火犯淫邪風所侮民病目赤大要有三一曰風助火鬱於上經云少陽司天之政風勝初之氣陽氣烈風乃行寒氣時至氣鬱於上面熱目赤經云少陰司天之政二曰火勝二之氣候乃大溫

其病氣拂於上目赤三曰燥邪傷肝三之氣歲金太過
燥氣流行經云陽明司天燥氣下臨肝氣上從脇痛面
目赤雖其間病有不同大要不出此三候也

目痛

經云有二一謂目背白眼痛一謂目珠黑眼痛蓋
目背白眼痛赤脈法於陽故也目珠黑眼痛屬陰故

夜則痛甚其苦寒藥則反劇經所謂瞳子黑眼法
於陰故也凡目痛皆屬於熱之所致煩燥者氣隨
火升也東垣云元氣虛損而熱輕手摸之熱在皮
手血脈也重手按之筋骨熱甚者熱在筋骨也不
輕不重而熱熱在肌肉也又云晝則發熱夜則發
靜是陽氣自熱於陽分也晝則安靜夜則發熱煩
燥是陽氣下陷入陰中也名曰熱入血室晝夜發
熱是重陽無陰也亟
瀉其陽峻補其陰也

天行赤熱症

天行赤熱時氣流行。三焦浮燥。淚澀睛疼。或椒瘡沙擦。或怕熱羞明。或一目而傳兩目。或一目自清寧。往往兩目相感。因虛被火。薰蒸雖曰淺病。亦弗爲輕。倘犯禁戒。變症蜂生。要分虛實。須辨六經。

此症目赤痛。或胞腫頭重。怕日羞明。淚涕交流等病。一家之內。一里之中。往往老幼相傳。然有虛實輕重不同。亦因人之虛實。時氣之輕重。若何各隨其所受而分經絡以發病。有輕重不可樂言。此章專爲天時流行熱邪。感染人或素有目疾及痰火熱病。水少元虛者。爾我傳染不一。若感染輕而本源清。邪不勝正者。七日自愈。蓋

火數七。故七日火氣盡而愈。七日不愈而有二七者。乃再傳也。二七不退者。必其觸犯及本虛之故。須防變生他症矣。宜服驅風散熱飲子。

驅風散熱飲子

連翹 牛旁子

研少

羌活

蘇薄荷

大黃

酒浸

赤芍藥

防風

當歸尾

甘草

少許

山梔仁

川芎

各等分

右剉劑白水二鍾煎至一鍾去滓食遠熱服。

少陽經加柴胡

少陰經加黃連

桑白皮散

治肺氣壅塞熱毒上攻眼目白睛腫脹日夜疼痛心頭煩悶。

旋覆花

枳殼

杏仁

去皮尖

桑白皮

天花粉

玄參

甘草 甜葶藶 甘菊花 防風 黃芩名辨

右爲末每服四錢水一鍾半生薑三片煎至八分去滓。

食後溫服。

鴻熱黃連湯

見二卷按此手少陰太陰足陽明少陽少陰之藥也

暴風客熱症

暴風客熱忽然猶胞脹頭疼淚似湯寒熱往來兼鼻塞口中沙澀痛難當

此症非天行赤熱兩我感染並寒熱似瘧病發則目痛以及腫脹如楹久積遲遲之比也乃素養不清暴急勞苦客感風熱卒然而發也有腫脹乃風熱夾攻火在血

分之故治亦易退宜服局方洗心散

局方洗心散

熱勝者服治風寒壯熱頭目昏痛肩背拘急

涎壅涕唾稠粘心神煩燥眼目睛疼及寒熱不調鼻

寒聲重咽乾渴

五心熱小便赤澀大便秘澀並宜服之

荆芥穗

甘草

當歸

大黃

赤芍藥

白朮

五錢

右為末每服二三錢生薑薄荷湯煎服

以白朮合大黃八心故名洗心而從以麻黃荆芥亦是表裏藥

洗肝散

風熱但務青服治風毒上攻暴作

薄荷葉

當歸

羌活

甘草

炙

山梔仁

炒防風

大黃

川芎

石等分爲末每服二三錢食遠泔湯調下。

羌活勝風湯

風勝者服見二卷

火脹大頭症

風火炎炎熾六陽面浮腫暈洎如湯羞明赤澀頭疼痛膜夜無寧不可當

此症目赤痛而頭而浮腫皮內燥赤也狀若大頭傷寒夏月多有此患有濕熱風熱濕熱多洎而皮爛風熱多脹痛而憎寒若失治則血滯於內雖得腫消而目必有變病矣宜服普濟消毒飲

普濟消毒飲

羅謙甫云先師監濟源院時四月民多疫疾初覺增寒體重次傳頭面腫盛目不能開上

喘咽喉不利舌乾口燥俗云大頭天行痘賊不相訪問
染之多不救先師曰夫身半已上天之氣也身半以下
地之氣也此邪熱客於心肺
之聞上攻頭目而為腫盛

黃連 黃芩 各五錢 白殭蚕 炒一錢 鼠粘子 連翹 橘紅

板藍根 黑玄參 柴胡 桔梗 甘草 稍生 馬屁勃

升麻 各二錢 人參 三錢

右為末半用沸湯調時時服之半用煉蜜為丸喻化之
右方以黃芩黃連味苦寒瀉心肺間熱為君橘紅味苦
平玄參柴胡苦寒解利諸毒生甘草甘寒瀉火人參甘
溫補氣為臣連翹鼠粘子味辛平板藍根味苦寒馬屁
勃白殭蚕升麻味苦平微寒行少陽陽明二經氣不得

佛指便味苦辛溫爲舟楫不令下行

或加防風蘇薄荷川芎當歸身咬咀如麻豆大每服五錢水二鍾煎至一鍾去滓溫熱食後時時服之如大便秘加酒製大黃一錢或二錢以利之腫勢甚宜砭刺之愚按時行疫疾雖由熱毒傳染其氣實之人下之可愈氣虛者槩下之鮮不危殆故東垣先生製爲此方以救氣虛者其惠溥矣

住痛解毒丸

礞砂

五錢

沒藥

五錢

川芎

荆芥穗

枳殼

白芷

石膏

家菊花

各一錢

麝香

五分

右爲米糊爲丸如桐子大每服錢半不拘時溫湯下

怕熱羞明症

怕日羞明症實虛兩境施目疼並赤腫絡滯氣行遲火熾兼脾燥心肝脾辨之但分邪實治病亦不難驅不疼不赤腫單爲血家虛

此症謂目於明亮之處而痛澀畏避不能開也凡病目者十之七八皆有此患病原在心肝脾三經總而言之不過一火燥血熱病在陽分是以見明亮而惡汨澀痛也蓋已之精光既弱則陽光不能敵矣是以陰黑之所則清爽然有虛實之辨蓋怕熱乃有餘之病羞明乃不

足之症。若目不赤痛而畏明者，乃血分不足，睛汗少而絡弱，故不能運精華以敵陽光也。宜服明目細辛湯。

明目細辛湯

治兩目發赤微痛羞明畏日怯風寒怕火眼
腫成紐聚大
便微硬

川芎

四分

藥水

當歸身

白茯苓

各五

紅花

細辛

各二

生地黃

蔓荊子

各六

防風

羌活

荊芥穗

各一

川花椒

麻黃

八分

桃仁

泡去皮
尖十箇

右剉劑水二鍾煎至八分去滓臨睡溫服

按此是太陽厥陰手少陰藥也

歸葵湯

一名連翹飲子治目中溜火惡目與
火癰澀小角聚久視昏花迎風有淚

詳見各目

卷之三

連翹

紅葵花

當歸

人參

甘草

蔓荊子

生地 各五分

升麻 八分

黃芪

酒黃芩

防風

羌活 各七分

柴胡 二分

右剉剉白水二鍾煎至八分食遠溫服

按此足三陽少陰
按此足三陽少陰
陰之藥也

吹雲膏

治視物瞬困無力
及迎風流淚羞明
月隔翳膜遮睛
此藥多點神效

防風

青皮

連翹 各四分

生地黃 一錢

細辛 一分

柴胡 五分

甘草

當歸身 各六分

黃連 三錢

薤仁 去皮

升麻 各三分

荊芥穗 一錢

右剉剉除連翹外用淨水二碗先熬諸藥去半碗八連
翹熬至一大盞去滓入銀盞內文武火熬至滴入水成
珠加熟蜜少許熬勻點之

沃明益陰丸

見二卷

瞼硬睛疼症

瞼熱睛疼似擦沙血瘀脾經隱肝家睛疼頭痛瞼堅硬泪
澀昏矇症變他

此症不論有障無障但兩瞼堅硬而睛疼若頭痛者尤
急乃風熱在肝肝虛血少不能榮運於目無水以滋火
反乘虛而入會痰燥濕熱或頭如縛血滯於脾白睛因

火繫而痛輕則驗生椒瘡重則腫脹如楸瘡血貫睛等
症治當敷藥翻轉開道若堅硬不能翻或頭痛腦脹不
退此頭風欲成毒之症也宜服二朮散

二朮散

治驗硬睛
疼去翳障

蟬退

去頭
足

龍膽草

酒洗
炒

黃連

酒洗
炒

枸杞子

焙乳
分

蒼朮

米泔
浸炒

地骨皮

白朮

土炒
分

牡丹皮

各等
分

右爲細末每服一錢食後荆芥湯調下

癰腫膏

麝粉

少許

黃蠟

代赭石

各五
錢研

細茶末

黃柏

細末

麻油

各一
兩

右為極細末入銅杓內油蠟同煎為膏塗敷於硬腫處

寒熱

凡患寒熱者由風邪外客於腠理或飲內漬於臟腑致血氣不足陰陽更勝而所作也陽勝則發熱陰勝則發寒陰陽交爭若正相干則寒熱往來時發時止然此症與瘧相似而發寒不致戰慄發熱不致悶亂

為異耳

赤痛如邪症

赤痛如邪症多招寒熱魔不認風寒瘧疾涼勿用過下虛兼上實裏急外疎多皆因客熱擾宜治要中和

此症專言目病而赤疼頭疼寒熱交作如風寒瘧疾狀凡病發目痛輕則一年數次重則舉發頻頻非此暴風客熱年發之症也此症係肝腎之故肝腎俱虛故熱在

內而陰虛火動寒者榮衛虛損外之勝裏不實而覺寒也若作風熱瘧疾再用剛劑治之則血愈虛而病愈深

矣宜服十珍湯

十珍湯 治虛損血枯上攻目痛

生地 酒洗 當歸 酒洗 白芍藥 炒 地骨皮 炒 知母 鹽酒

丹皮 酒洗 天門冬 去心 麥門冬 去心 人參 去 甘草 五

右剉剉白水二鍾煎至八分去滓溫服

太陰虛者未有不動火苦寒直泄之藥惟病端初起元氣未虛勢方蘊隆脉鼓而數者暫取治標稍入涉虛便不可服王太僕曰治熱未已而中寒更起且足太陰傷

而絕肺金孕育之原矣。斯以地黃爲君。知母爲佐。壯天一之水以制丙丁。不與之直爭也。當歸白芍藥以沃厥陰。腎肝同治之法也。水衰則火旺。是以牡蛎二皮爲剋制。火盛則金衰。是以天麥二冬爲屏障。人參補金位之母。甘草生用。所以奉令承使。奔走贊成者也。

酒調洗肝散

治實熱氣攻眼無時痛甚

黑玄參

大黃

黃芩

山梔仁

生地黃

知母

桔梗

當歸尾

玄明粉

各等分

右爲細末。每服二三錢。食遠溫酒調下。日進二服。

痛如針刺症

痛如針刺。屬心經火燥。珠疼熾盛。行戒酒忌辛。休躁怒。忌教症。變漸相生。流火輕微。惟一點。蒸然有處。似鍼疼。防微杜漸。宜君火泄。破炎。痛目自明。

此症謂目珠疼如鍼刺也。病在心經。火實有餘之症。若痛蒸然一二處。如鍼刺痛。目雖不赤。亦是心經流火。別具痛在何處。部分以見病將犯其經矣。按此症多有體虛目勞。兼染淋濁之病。榮氣不上。潮於目。而如鍼刺之痛者。宜養其榮。若降火則急矣。宜服加減八正散。

加減八正散

治心熱。衝服赤腫。痛熱淚羞。明兼治大小便赤。澀或癢。閉不通。及熱淋。血淋。並宜治之。

滑石

甘草稍

大黃

熬

木通

瞿麥

車前子

梔子

炒

扁蓄

各等分

右為末。每服五錢水二鍾燈心三十段煎至八分去滓溫服

經曰膀胱不利為癰。理宜入正散以通之。滑可去滯。滑石車前皆滑也。瀉可去實。大黃甘草梔子皆瀉也。通可去滯。瞿麥扁蓄木通燈心皆通也。若虛弱輩則大黃不宜用也。加生地黃桑白皮苦竹葉以清療之。

頭痛

子仲云頭痛不止乃三陽受病也。三陽分部分額與頭痛者足太陽經也。額竹痛俗呼為眉後骨痛者是也。額角上痛俗呼為偏頭痛者足太陽經也。如痛久不止則令人喪目以三陽受病者難醫有

宿痰之致然也。先以茶調散吐之。吐訖可服川芎薄荷半兩清上之藥。叔和云寸脈急而頭痛是也。

大小雷頭風症

雷頭風痰來之最急症。類傷寒。頭如斧劈。目若錐鑽。身如火炙。大便不通。小便赤澀。痛不可禁。禍亦難測。痰滯已甚。應知爆出。着意速醫。勿延時刻。瀉火爲先。須防胃液逼損。精純終當一失。

此症不論偏正。但頭痛挾痰而來。痛之極而不可忍。身熱目痛便秘結者。曰大雷頭風。若頭痛大便先潤後燥。小便先清後澀。曰小雷頭風。大者害速。小者稍遲。雖有大小之說。而治則一。若失之緩。禍變不測。目必損壞。輕

則癰凸重則結毒宜早為之救以免禍成宜服清震湯

清震湯

兼治發熱惡寒口渴頭痛

升麻

赤芍藥

甘草

荆芥穗

葛根

蘇薄荷

黃芩

香荷葉

蒼朮

米泔水浸一宿炒各等分

右剉剉白水二鍾煎至八分去滓熱服

加味調中益氣湯

治氣血俱虛頭痛其效如神

嫩黃芪

一錢

升麻

細辛

各二分

廣皮

四分

廣木香

川芎

人參

甘草

炙

蔓荊子

當歸

蒼朮

米泔水製

柴胡

各五分

右剉剉白水二鍾煎至八分去滓熱服

將軍定痛丸

治顛頂痛快痰濕熱者服輕眩暈用

黃芩

酒洗七錢

白殭蚕

陳皮

鹽煮去白

天麻

酒洗

桔梗

各五錢

青礞石

煨

白芷

各二錢

薄荷

三錢

大黃

酒蒸九次焙乾二兩

半夏

牙白煎汁煮

右為紙牙流水為丸如菉豆大每服二錢食後臨卧茶

清吞之

藥枕方

治頭風自眩

通草

防風

葛蒲

甘草

犀角

剉末

羚羊角

剉末

蔓荆子

各三錢

細辛

白芷

藥本

真川芎

白朮

黑豆

一升半揀擇

按令淨

右爲細末相拌均勻以生絹囊盛滿實置在盒子內其盒形如枕枕時揭去盒蓋令藥氣透氣入頭不枕卽蓋之使藥氣不散枕之日久漸低再入前藥仍要滿實或添黑豆三五日後藥氣微則換之枕旬日或一月耳中雷鳴是藥祛風之驗也

左右偏頭風症

左右偏頭風發則各不同左發則左壞右發則右壞人多不爲慮致使失光明

此症左邊頭痛右不痛者曰左邊風右邊頭痛左不痛者曰右偏風世人往往不以爲慮久則左發損左目右

發損右目有損左反攻右右損反攻左而兩目俱損者
若外有赤痛泪澀等病則外症生若內有昏渺眩暈等
病則內症生凡頭風痛左害左痛右害右此常病易知
者若左攻右右攻左痛從內起止於腦則攻害也遲痛
從腦起止於內則攻害也速若痛從中間發及眉稜骨
在工星中發者兩目俱壞亦各因其人之觸犯感受左
右偏盛起患不同遲速輕重不等風之害人尤慘宜服

羌活芎藭湯

治太陽經頭風
頭痛夜熱惡寒

半夏

剉杏仁

去皮

川羌活

藥本

川芎

防風

白茯苓

甘草

白芷

麻黃

廣陳皮

桂枝

各等

右剉劑白水煎服內熱加酒製黃芩薄荷葉生薑三片煎服

柴芎湯

治少陽經頭風頭痛寒熱而嘔

川芎

白茯苓

柴胡

蘇薄荷

細辛

製半夏

黃芩

炙甘草

陳皮

蔓荊子

各等分

右剉劑生薑三片白水二鍾煎至八分食後服。

蒼朮湯

治太陰經頭風頭痛腹滿不食并腹痛

蒼朮

白芍藥

枳殼

白茯苓

白芷一廣陳皮

川芎

炙半夏

升麻

炙甘草

各等分

右剉劑生薑三片白水二鍾煎至八分食後服

細辛湯治少陰經頭風頭痛四肢厥但欲寢者

細辛 廣陳皮 川芎 製半夏 獨活 白茯苓

白芷 炙甘草各等分

右剉劑生薑三片白水二鍾煎至八分食後服。

吳茱萸湯治厥陰經頭風頭痛四肢厥嘔吐痰沫

半夏洗 吳茱萸 川芎 炙甘草 人參 白茯苓

白芷 廣陳皮各等分

右剉劑生薑三片白水二鍾煎至八分食後服

升麻芷葛湯治陽明經頭風頭痛身熱日渴者服

升麻 家乾葛 白芷 蘇薄荷 石膏 廣陳皮

川芎 製半夏

甘草

各等分

右剉劑。生薑三片。白水二鍾煎至八分。食後服。

眉骨痛

按眉稜骨痛有二。眼屬肝。有肝虛而痛。終見光

不能開。晝夜劇宜導痰九。湯主地黃九。有眉稜骨痛。目赤。清州白九。子亦効。市見眉稜骨痛者。多是肝火。上炎怒氣甚者。多有此病。其謂風症。亦火之所致。熱甚生風是也。大抵抑肝火。有風疾。則兼而治之。

陰邪風症

陰邪額角痛。多向熱時來。元虛成內障。火實外生災。此

症專言額角板骨及眉稜骨之病也。發則在陽明。少陽用

事之時。元虛精弱者。則爲內症。若兼火痰者。則爲外症。宜

服加味柴胡湯。

加味柴胡湯

柴胡 酒芩 荆芥穗 製半夏 甘草 川芎

香白芷 蘇薄荷五片 防風 前胡各等分

右剉剉生薑三片白水二鍾煎至八分食後服。

生熟地黃湯治目不光明眉骨痛甚此係肝虛法當養血涼血益血痰火降而風熱除

熟地黃 甘草 生地 五味子 當歸身 酒芩

枳殼 地骨皮 天門冬 人參 柴胡 川黃連

右剉剉白水二鍾煎至八分食遠服。

驅風止痛散治風熱上攻

酒黃芩 白芷錢半 羌活 防風 柴胡稍各一錢

川芎

二錢 荆芥 八分 甘草 五分

右爲細末。每服四錢。白水二鍾。前至八分。食後服。

上清散

治因風頭痛。眉骨眼。痛不可忍。者。

乳香

另研

沒藥

一錢 研各

腦子

另研

赤芍藥

川芎

薄荷

芒硝

荆芥穗

鬱金

各五

右爲細末。每用一字。口噙水。鼻內搐之。甚妙。

陽邪風症

枕痛是陽邪。寒時痛最。年來不着意。致使眼生花。

此症專言腦後枕骨痛之病也。多發於太陰用事之月。發則有虛昏耳鳴之患矣。久而不治。內障成耳。宜服。

防風羌活湯

治眉棱骨痛而風寒在腦或感痰濕及腦昏痛宜此。

防風 川羌活

半夏

姜製黃芩洗酒

南星姜製北細辛

白朮

炒上甘草炙

川芎

各等分

右剉劑白水二鍾煎至八分去滓熱服。

子和搜風丸

治風熱上攻眼昏耳鳴鼻淵頭痛眩暈逆痰延嗽心腹疼痛大小便澀滯。

人參

茯苓

天南星

姜製黃芩洗酒

薄荷

各五錢

黃芩

酒炒半夏姜製

乾生姜

寒水石

蛤粉

大黃

生白礬

各一兩

黑牽牛

滑石

各一兩

藿香

二錢

右爲細末水盪爲丸如桐子大每服二三錢量其體之

虛實每用生姜湯送下日進三服

按此方名為搜風其實乃下實熱痰症藥也

磁石丸 治已上頭風。變成內障服。

磁石 澆紅醋浸三次乾姜炒 五味子 杜丹皮 玄參

附子 錢地二

右為細末煉蜜為丸如梧子大每服十丸食前茶清下

目赤 戴復菴云赤眼有數種氣毒赤者熱藥赤者有時服赤者無非血壅肝經所致蓋肝主血通竅於眼

赤血病也。

瘀血灌睛症

無端瘀血灌睛瞳喪目亡明是禍端。變症風生休小視。急

將開尊用鍼砭

此症爲目病最毒。舉世無知。若人偏執已見。不用開砭者。其目必壞。初起不過紅赤。次後紫脹。及白睛脹起。甚則脹形如虬筋。蓋其病乃血貫睛中。滯塞不通。在脾則腫脹。如梧椒瘡之患。在珠則輪湧起。凝脂黃膜。痕癢成窟。花翳白陷。鵝眼凝睛等症。失治者必有青黃膜出。槲凸之禍。凡見白珠赤紫。脾腫虬筋紫脹。敷點不退。必有瘀滯在內。可翻胞內視之。若眼胞已發。泛浮。椒瘡粟瘡者。皆用導之之法。不然變症生矣。宜服安珠散。

安珠散

治眼患瘀血灌睛惡血不散

槐花

生地黃

白芷

炒梔子

荊芥

龍膽草

黃芩酒赤芍藥

甘草

當歸尾

各等分

右爲末每服三錢白水二鍾煎至八分去滓熱服春加

大黃瀉肝夏加黃連瀉心秋加桑白皮瀉肺

宣明丸

治眼內熱血貫睛赤腫澀痛火熱塞上

赤芍藥

當歸尾

黃連

大黃

生地黃

薄荷葉

黃芩

川芎

各等分

右爲末煉蜜爲丸如桐子大每服三錢食後米飲送下

血貫瞳神症

血灌瞳神病最奇世之患者亦云稀神膏膽汁俱傷損急

急醫時亦是遲

此症謂視瞳神不見黑瑩但見一點鮮紅甚則紫濁病
爲甚危一二日尚可救蓋腎之真一有傷。膽中精汁皆
損元陽正氣皆耗故此一點之神光不見而血之紅色
來乘腎部十患九不治者今人但見瘀血灌時便爲血
灌瞳神不知血灌瞳神乃清陽純和之氣已損其英華
血色乘於腎部命亦不久豈若火入血分瘀凝有形之
急者比乎宜服

墜血明目飲

細辛 人參各錢 赤芍藥 五味子十粒 川芎酒洗
牛膝炒 石決明醋 生地黃 山藥 知母鹽水

白茯苓研去 雷歸尾 防風各八

右剉劑，白水二鍾，煎至八分，去滓溫服。

摩挲石散

摩挲石少許 空青 龍腦 石膽各

右研極細膩粉，每日早晨、夜後點眼。

落紅散治血貫瞳神

穿山甲炒 桔梗炒 礞砂研細 人退焙各 穀精紙焙

蟬退去頭 蛇退蟬蛇二退人 不食紙烘乾為末各一錢

右為細末，吹入鼻中，次日以筒吸目，漸次為之，自然障

落

造吸筒法或用好銅打成漏斗相似筒上留一竅用猪
脂薄皮扎筒竅上如臨用時以筒口安病目上醫者吸
氣一口次看其翳輕重漸吸則漸除矣

色似胭脂症

白珠火滯血難通色似胭脂染抹紅清肺制金頻散血莫
教久滯在輪中

此症白睛不論上下左右但見一片或一點紅血儼似
胭脂者是此曰血熱妄行不循經絡偶然熱客肺膜之
內滯而成患常有因嗽起者皆肺氣不清之故須以清
肺散血之劑外點藥遂之宜服

退赤散

桑白皮蜜炙甘草

牡丹皮

酒洗黃芩酒炒

天竺粉

桔梗

赤芍藥

歸尾

爪萐仁

去殼油為霜各等分

右為細末每服二錢麥門冬去心煎湯調服

赤絲虬脈症

赤絲虬脈起自白睛縱橫赤脈遠在風輪虬來龍細各有
重輕燥熱濕熱澀急羞明或膜或痛或泪如傾或不疼癢
只是昏朦勿視天行赤熱勿視赤脈貫睛久而不治變症
峰生量其虛實治以安寧

此是謂氣輪有絲脈赤虬常時如是者或因日病初起

失養致血滯於絡而赤者其病生在氣輪白珠有絲脈縱橫或稀密籠細不等但久而不愈非諸赤熱之比若只赤此昏昧溫熱不寒或有微汗溫熱者輕因犯傳變者重若脈多赤亂兼以粘澀而緊痛汗濕而爛腫者看從何部分來或穿連某位即別其所患在何經絡或傳或變自病合病等症分其生剋乘制然後因症分經以治之凡見絲脈亂紫內服外點點時細縮不點即脈若激動病變者珠雖不紫胞雖不腫亦有滯在絡中幽深之所故未脹出耳須揭開上胞深處看之其內必有不平之色因其滯而量其輕重各略導之不可太過過則

傷其真血。水虧膏涸。昏弱之患至矣。宜服點並行退熱散。

赤芍藥

黃連

炒

水通

生地黃

炒梔仁

黃柏

鹽水炒

黃芩

炒

當歸尾

丹皮

甘草

稍各等分

右為末。每服五錢。白水二鍾煎至八分。去滓熱服。

點眼蕤仁膏

治風熱眼。飛血赤脈。癢痛無定。

蕤仁

去殼去皮。心膜。油取霜五錢。

好酥

子大

右將蕤仁與酥和勻。研攤碗內。用艾一小團燒烟出。將碗覆烟上。薰待艾煙盡。即止。重研勻。每以麻子大點眼。兩眦頭日二度。

白痛

白眼痛有表裏等症或疼痛而痛從外走內者宜溫之散之有不紅腫而溫痛者火伏氣分傷白散為主有白珠變青藍色乃鬱邪蒸通走散其巾極宜調氣以養之

白澀症

不腫不赤爽快不得沙澀昏瞶名曰白澀氣分伏隱脾肺

濕熱

此症南人俗呼白眼其病不腫不赤只是澀痛乃氣分隱伏之次脾肺絡濕熱秋天多患此俗稱稻芒赤目者非也

桑白皮湯

桑白皮半

錢澤瀉

黑玄參

各八分

甘州半

二分

麥門冬

去心

黃芩

旋覆花

各一分

菊花

五分

地骨皮

桔梗

白茯苓

各七分

右剉剉白水二鍾煎至一斗去滓溫服

白珠俱青症

邪攻精液神膏走色變青藍無白珠急訪明醫求妙手免
教走盡悔之遲

此症乃目之白睛忽變青藍色也病症尤急蓋氣輪本
白被鬱邪蒸逼走入珠中膏汁遊出入於氣輪之內故
色變青藍瞳神必有大小之患失治者瞳神損而終身
疾矣宜服

還陰救苦湯

見二卷

天麻湯

天麻

家菊花

川芎

當歸身

羌活

白芍藥

甘艸

各等分

右剉劑白水二鍾煎至八分去滓食後熱服

傷寒瘧後白珠青者加柴胡麥門冬

去心

黃芩天花粉

毒氣所攻白珠青者加黃芩牛旁子

炒研

連翹黃連

目癢

癢有因風因火因血虛而癢者大約以降火為主然有為血行而癢目將復明火散發癢宜平肝滋

營為主

癢如蟲行症

癢如蟲行病屬肝心無病而癢病始來侵有疾而癢其病

愈深常時小癢又當辨明輕重進退宜審其因

此症非謂常時小癢之輕如蟲行之癢不可忍者須驗目上有無形症決其病之進退至於有障無障皆有癢極之患病源非一有風邪之癢有邪退火息氣血得行脉絡通暢而癢大抵有病之目久不治而作癢者癢一番則病重一番若醫治用藥後而癢作者病必去速若癢極難當時時頻作目覺低陷者命亦不久矣有癢極而目脫者死期近矣泪多者血虛夾火大抵痛屬實癢屬虛雖火乘虛而入非其本病也宜服

驅風一字散

治目癢極難忍

川烏炮川芎

荆芥穗

各五錢

羌活

防風

各二兩五錢

右為細末每服二錢食後蘇薄荷湯調下

人參羌活湯

治肝熱濕痰昏朦

赤茯苓

人參

羌活

獨活

地骨皮

川芎

柴胡

桔梗

細甘草

枳殼

前胡

天麻

各等分

右剉劑白水二鍾煎至八分去滓熱服瘥甚者加防風

荆芥穗

廣大重明湯

治兩目腫赤爛熱腫痛目胞脹及眼臉癢極抓至破爛眼弦生瘡痂目多眵痛癢澀難開

防風

川花椒

龍膽草

甘艸

細辛

各等分

右剉如麻豆許大內甘草不剉只作一挺先以水一大

碗半煎龍膽草一味乾一半再入餘三味煎至小半碗
去滓用清汁帶熱洗以重湯頓令極熱日用五七次洗
畢合眼須臾癢亦減矣

腫脹

按腫脹有風熱上攻有燥火客邪或黑珠疼甚或
白睛腫痛皆因肝經實熱或脾熱肺熱俱宜清火

散風
治之

腫脹如楹症

腫脹如楹目最疼泪多怕熱與羞明若侵頭腦連眶痛水
火爲殃禍不輕勿使睛中灌瘀血管教變症似風生

此症謂目赤痛胞膜如楹覆也是肝火有餘脾土受尅
腎水不能生故火邪反乘虛而爲炎燥之病其珠必疼

目胞緊硬若暴風客熱而作痛者必多熱泪而珠痛猶
爲稍緩風熱外感易治若木火內攻則病退遲重則瘀
壅塞目血灌睛中而症變不測須用開導輕則敷治而
退重則必須開導若敷治不退退而復返開導不消消
而復痛連於頭腦腫愈高而則愈實此風熱成毒也宜
服點

散熱消毒飲子

牛旁子

研炒

羌活

黃連

黃芩

蘇薄荷

防風

連翹

各等分

右剉碎。白水二鍾煎至八分去滓食後服

金絲膏 治風熱上攻
口赤腫痛

黃連 能膽艸

大黃 黃柏 去當歸

山梔仁 各一兩

乳香

去油研

明沙

燈心

各二錢半

青竹葉

片一百

大棗

去核

二十枚

若用水五升不拘冬夏浸一時辰取出於銀石器內慢

火熬不令大沸候滓出汁外下火放冷用絹絞取汁於

無風塵處澄一時辰去滓於器內用慢火熬令減半入

白蜜半斤同攪藥蜜蠟和以筋挑起有絲則止放冷再

以夾絹袋濾過用磁盒盛之每取一茶匙許研能腦一

字極細入膏同研二千遍令勻取少許點之

狀若魚胞症

白睛拳肉起其狀若魚胞緣因肺火搏致爲日禍招清涼
宜早治依舊復平消

此症氣輪腫起不紫不赤或水紅或白色狀若魚胞乃
氣分之病不用開導惟宜清涼自然消復若頭疼目熱
及內燥而赤脉多者防有變症宜服

玄參飲

治肺臟積熱白睛腫脹遮蓋
瞳神開張不得赤細疼痛

玄參

漢防已

升麻

羚羊角

錢末

沙參

車前子

梔子炒桑白皮

大黃

微炒

火麻仁

杏仁

去雙仁皮火湯浸
麩炒黃各等分

右判剉白水二鍾煎至八分去滓熱服

洗眼青皮湯

治眼白睛腫
脹赤滿痛癢

萎蕤去殼

桑白皮

青皮各一分

玄參

大黃

梔子仁

各五分

青鹽

一分

竹葉

十片

右剉剉水二鍾煎至一鍾濾去滓入鹽微熱淋洗冷即再炖熱洗

鵝眼凝睛症

眸子起災轉動不得壅滯不通三焦閉格名鵝眼凝睛防變出之疾

此症有項強頭面臉赤燥之患其狀目如火赤脹於胞間不能斂運轉動若廟堂凶神之目猶鵝鳥之眼珠赤而定凝故曰鵝眼凝睛乃三焦閉格陽邪實盛充極之

害風熱壅阻諸絡澹澹而目欲脫出矣先於內迎香太陽
兩脚上星等穴要臨之所並鍼而攻治之宜內服外貼
瀉腦湯

防風 車前子 木通 羌活子 茯苓 熟大黃

玄參 玄明粉 桔梗 黃芩酒炒各等分

右剉劑白水二鍾煎至八分去滓食遠熱服

摩風膏

黃芪 細辛 當歸 杏仁去皮尖 防風 松脂各

白芷以上各一兩 黃蠟各一兩 麻油四兩

先將蠟油溶化前藥共研為細末慢火熬膏絞入退其

火性貼太陽穴

旋臚泛起症

氣輪自平水輪尚明惟風輪而湧起或赤脉以縱橫肝氣獨盛血液欠清莫使風輪俱突致累損及臚神

此症目病氣輪自平惟風輪高聳而起也或有從風輪左邊突起亦有右邊突起者乃肝氣獨盛臚液澀而肝血滯火鬱風輪肝胆火脹起或上或下或在左右各隨火之所移從上脹者多成此症旋螺尖起而黑輪俱出起頂尖不可醫者類也宜服

瀉肝散

升麻 木賊草 細辛 甜葶藶酒炒 黃連酒炒 五靈脂

陳皮 家菊花 黃芩酒炒 赤芍藥 大黃酒炒 蘇薄荷

防風 梔子仁炒 甘草 玄明粉各等分

右為細末每服二錢食後白滾湯調下為劑亦可煎服

胸脹者加枳殼厚朴

救睛丸兼治內障青育有翳

當歸身 蒼朮泔水炒 荆芥穗 蟬退去頭足如頭 草決明炒

川芎酒炒 蘇薄荷 甘艸 谷精藎 枳殼炒 木賊草等分

右為末煉蜜為丸如彈子大每服一丸食後茶清化下

殊突出眶症

珠突出眶。疼痛難當。既離兩臉。枉覓仙方。虛乃氣血之不足。實則暴火之爲殃。若然半出。尤可復康。脉絡旣動。終是無光。

此症專言烏睛暴然突出眶外。其與鴨眼症。因滯而慢慢脹出者不同。有真元將散。精華衰敗。致脉絡俱損。癢極揩擦而出者。其人不久必死。有醉酒怒甚。以及嘔吐極而突出者。有因患病熱甚。致關格亢極而脹出者。有因怒甚吼叫而奔出者。皆因水衰液少。精血虧損。故脉絡柔脆。邪氣盛極。火無從出。而竅澀固之不及。故湧脹而出。有因打撲而出。此亦偶然之禍。凡出雖離兩臉而

脉絲未斷者乘熱納入。雖入脈絡損動終是無光。若雖突而猶含者易入。光不損。若離臉脉絲絡俱斷而出者不能救矣。宜服

救睛丸

枸杞子

蒼朮

山梔仁

炒

赤芍

蘇薄荷

各等分

右爲細末。酒糊爲丸。如桐子大。每服三錢。井花涼水送下。或冷茶清亦可。少年之人可服。年老之人可服。後方

立退丸

一名定志丸

硃砂

另研爲衣

人參

各二錢

天門冬

去心烘乾

石菖蒲

炒

遠志

去心

麥冬

去心

預知子

各一兩

白茯苓

二兩

右爲細末煉蜜爲丸如桐子大每服一錢五分茶清送下或沸湯亦可

水淋法

治眼腫脹突出新汲涼井水沃眼中頻數換水

外障

凡赤脉翳初從上而下者屬太陽以太陽主表其

治宜溫之散之赤脉翳從下而上者或從內背出外者皆屬陽明以陽明主裏其症多熱或便實是也治以下之寒之赤脉翳初從外背入內者爲少陽主半表半裏治宜和解之翳膜者風熱重則有之或班入眼此肝氣盛而發在表翳膜乃生在表明矣宜發散而去之也若用疎利則邪氣內搐爲翳益深邪氣未定謂之熱翳而浮邪氣已定謂之水翳而沉邪氣未而深者謂之陷翳當以椒發之物使其邪氣再動翳膜乃浮佐之以退翳之藥而能自去也病久者不能速効宜以歲月漸除之新翳所主表散方東垣羌活除翳湯有熱者退雲九之類歟發陷翳保命集羚羊角散之類治法在人消息若陰虛有熱者兼服神仙

退雲
九。

黃膜上衝症

黃膜上衝病最真。風雲膏內起黃雲。白際黑雲深處裏。直從坎位灌瞳神。只因大便結。最惡是頭疼。經絡多壅滯。火燥澀炎蒸。錯認湧波翳。空令日不明。

此症於風輪下際坎位之間。神膏內初起而色黃者。如人指甲根白岩相似。若凝脂之症。但凝脂翳從輪外生。點藥可去。此在膏內點藥所不能及者。若漫及瞳神。其珠必破。不可誤認爲湧波治之。此是經絡塞極。三焦關格。火土諸邪之盛實者。故大便秘而小便塞。黑膏火蒸。

作膿而上衝失治凸樞之患必矣宜服

通脾瀉胃湯

是症最逆非一方可療看定脉之虛實當隨所因置方施藥可也

麥門冬

去心

荒蔚子

各一錢半

知母

玄參

車前子

軟石膏

煨

防風

各一錢

酒黃芩

七分

天門冬

七分

熟大黃

七分

右剉剉白水二鍾煎至八分食遠服熱甚者加玄胡粉

一錢

立應散

治內外障翳昏滿多泪及暴赤眼一切目疾並皆治之摘鼻取嚏。

鷺不食草

洗淨晒乾

香白芷

洗

當歸

洗去翳

羊躑躅花

城半

川附子

炮去皮

雄黃

另研後入各等分

右為細末入麝香少許和勻含水噴鼻內去盡濁涕泪

出爲度

赤膜下垂症

赤膜下垂。腦蘊熱。珠若痛時有滯血。要求變症。不生時。上胞瘀血須開決。

此症初起甚微。次後甚大者。病急。其患有障色者。多赤脈從白輪貫下也。而黑珠上邊從白際起障一片。仍有赤絲牽絆脹大。絲麓赤甚。泪澀珠疼。頭痛者。病急而有變。絲細少色微。赤珠不疼。頭不痛者。緩而不變。亦有珠雖不疼。頭不痛者。如無他症。或只色赤而生薄障。障上仍有細絲牽絆。或於障邊絲下。仍起星數點。此星亦

是凝脂之微病也。此等皆是火在內滯之患。其病尚輕。治亦當善。蓋無形之火潛入膏內。故作是症。非比有形血熱之重也。若障上有絲。及星生於絲稍。皆是退遲之病。爲接得絲脉中生氣。故易生而難退。雖然退遲亦善。退爲上。至於甚者不得已而開導之。大抵白珠上半邊有赤脉生起垂下黑珠者。不論多寡。但有疼痛。虬赤便是凶症。縱是絲少赤微。或細釐連斷。或貫瞳神。或翳薄翳厚。皆是惡症。便是可治亦當耐久。此症係濕熱在腦。幽隱之火深潛。在絡。故有此脉之赤。四圍雖無瘀血。其深處亦有滯積。故滯深而火赤甚。一旦觸動則患迸發。

疾亦甚矣。內見瀉滯，外有此病，輕者消散，重者開導。此

一定之治法也。宜服

皂角丸治內外一切障膜。此藥能消膜除翳。治

川山甲炒 蟬退 白朮炒 玄精石生 穀精生 當歸酒洗

茯苓 木賊炒 赤芍藥各一兩 龍退七條 連翹一兩

刺蝟皮蛤粉 龍膽草炒 菊花各兩 人參 真川芎各五錢

獾猪瓜蛤粉炒

右為細末。一半入猪牙皂角二條，燐灰和勻，煉蜜為丸。如桐子大。每服三十九，空心杏仁湯送下。一半入仙靈脾一兩，為末和勻。每服一錢，用猪肝夾藥煮熟細嚼及

用原汁湯送下每日進三服

洗眼金絲膏

治遠年近月翳膜遮睛，攀睛努肉，昏暗泪多，瞻視不明，或風氣攻注，胞生風粟，或連膜赤

爛怕日羞明，隱澀難開。

黃連

去鬚五錢

雄黃

研二錢

麝香

另研三分

赤芍藥

另研

硃砂

另研

乳香

另研

硼砂

另研

當歸尾

各二錢五分

右為細末，後入研藥拌勻，再研煉蜜為丸，如皂角子大。

每用一九，安淨盞內沸湯泡開，于無風處洗藥，冷閉目。

少時候三兩時，晨再煨熱，依前洗一圓，可洗三五次，勿

犯銅鉄器內洗，如暴赤眼腫者，不可洗也。

凝脂翳症

若問凝脂翳世人皆不識此是禍之端變症不可測血滯
神膏傷氣壅經絡澀熱向腦中催膿攻如風急有糠或無
糠嫩而帶黃色長大不多時膏瞽定可必緩則膏俱傷非
枯應是凸若不急早醫當作終身疾

此症爲疾最急盲瞽者十有七八其病非一端起在風
輪上有點初生如星色白中有糠如鍼刺傷後漸漸長
大變爲黃色糠亦漸大爲窟者有初起如星色白無糠
後漸大而變色黃始變出糠者有初起便帶鵝黃色或
有糠無糠後漸漸變大者或初起便成一片如障大而
厚色白而嫩或色淡黃或有糠無糠而變者或有障又

於肉內變出一塊如黃脂者。或先有痕癢後變出凝脂
一片者。所變不一。爲禍則同。治之不問星障但見此時
已浮脆嫩能大。而色黃。善變而速長者。卽此症也。初起
時微小。次後漸大。甚則爲窟。爲漏。爲蟹睛。內消睛膏外
爲枯凸。或氣極有聲。爆出稠水而破者。皆此鬱迫之極。
蒸灼肝膽二絡。清氣受傷。是以枯及神膏潰壞。雖遲不
過旬日而損及瞳神。若四圍見有瘀滯者。因血阻滯道
路。清汁不得升運之故。若四圍不見瘀滯之甚者。其內
絡深處必有阻滯。此見此症。必當晝夜醫治。若遲待長
大而破滿黑睛者。雖救得珠完。亦帶疾矣。治後珠上必

有白障如魚鱗圓狀等翳終身不能脫若結在當中則視昏渺耳凡目病有此症起但有頭疼珠痛二便燥澀即是極重之症二便通利禍亦稍緩一有於斯尤爲可畏世之治者多不能識其變幻爲害甚矣宜服

四順清涼飲子

當歸身

龍膽州

酒洗

黃芩

桑皮

蜜製

車前子

生地黃

赤芍

枳殼

各八分

炙甘草

三分

熟大黃

防風

川芎

川黃連

炒

木賊草

羌活

柴胡

各六分

右剉劑白水二鍾煎至八分去滓食遠服

此醫白陷症

凝脂四邊起膏傷目裏矣風輪變白膏低陷知沉翳雖是見瞳神終歸難料理

此症因火燔絡內膏液蒸傷凝脂從四圍起而浸神珠故風輪皆白或微黃色看之與濕障相似而嫩者其輪白之際四圍生翳而漸漸厚潤中間尚青未滿者瞳神尚見只是四圍皆起中間低陷此金剋木之禍也或於脂下起黃膜一片此二症夾攻尤急亦有上下生起名順逆障此症乃火土鬱迫之禍也亦有不從沿際起只自凝脂色黃或不黃初小後大其細條如翳或細顆如星四散而生後終長大連混合而害目此是木火之

禍也以上三者必有所滯治當尋其源濬其流輕則清
涼重則開導若未慢及睽神不甚厚重者速救可以挽
回但終不能如舊雖有瞳子光不全矣宜服點

洗肝散

當歸尾 川芎 防風 蘇薄荷 生地黄 紅花

蘇木 家菊花 白蒺藜去刺 蟬退去頭翅 羌活

赤芍藥 各五錢 甘艸 二錢

右爲末每服三錢白水二鍾松絲十餘根煎至八分去
滓服

琥珀散 治目積年
生花翳

烏賊魚骨

五錢先於籠石磨去
硬壳用好者一錢

硃砂

白者

琥珀

馬牙硝

珊瑚

硃砂

各五錢

珍珠

一兩
為末

右研極細膩令勻每日三五次點於白翳處久閉方可

蟹睛症

膏出風輪破欲流蟹睛形狀吐珠眸及時醫治毋遲緩瞳
子傾危不可收莫待青黃俱凸出清光今世好難求

此症謂真精膏損凝脂破壞風輪神膏綻出黑顆小如
蟹睛大如黑豆甚則損及瞳神則有杏仁棗核之狀至
極則青黃凸出此症與黑翳如珠相類而治則不同夫
黑翳如珠從膏內生起此症因破而出然有虛實二症

虛者軟而不疼來遲可去實者堅而多痛來速難去今
雖急治亦難免癰痕矣宜服

防風瀉肝散

遠志肉

人參

桔梗

細辛

赤芍藥

防風

黃芩

甘草

羚羊角

銼細末
名等分

右爲細末每服錢半或二錢食遠沸湯調服

瀉肝湯

治實熱蟹
睛眼

地骨皮

玄參

車前

玄明粉

各一錢

芫蔚子

二錢

大黃

知母

各一錢半

右剉劑白水二鍾煎至八分去滓食後服

冰瑕翳症

冰瑕翳似水清瞳神在內見分明年月雖多終不去世人盡道一回星每有愚人不治兩目終難朗照光滑清薄又無多陽看大兮陰看小金水滯氣最難醫點藥整年猶未好若在風輪不掩瞳視有光明且休惱

此症薄薄隱隱或片或點生於風輪之上其色光白而甚薄如冰上之翳若在瞳神傍側或掩及瞳神者人雖不覺目自昏眊大凡風輪有痕癢的點服不久不曾補得水精膏足及凝脂點等症初發點服不曾去得盡絕並點片腦過多障迷未去得盡而金氣水液凝結者

皆為此症大抵治雖不能速去然新患者必用堅守確
攻久而方退若滑澀深沉及久患者雖極治亦難盡去
矣宜服

開明丸

治遠年近日翳障昏育
寂無所見一切目疾

羊肝

須用白羊肝一具切薄片瓦上焙乾研作末或只
以肝煮爛研為丸庶可久留少則以蜜漬之亦可

官桂

五錢

兔絲子

水淘

決明

防風

杏仁

炒去

地膚子

羌藟子

葶藶

炒

黃芩

麥冬

肉

去心

五味子

蕤仁

去皮

細辛

不可

枸杞子

青箱子

澤瀉

車前

各一

熱地黃

兩半

搗膏

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服三十丸白滾湯送

下日進三次仍忌生姜糟酒炙燥熱物

琥珀煎

治眼生丁翳久治不瘥。

明珠砂

易研目齒錢各五

琥珀

易研龍腦錢各二

馬牙

稍煉過者

七錢半

右同研極細膩如麵以水一盞加白蜜一兩攪和入乾

淨磁罐中重湯煮以柳木枝煎約計一合即取起再以

綿濾過於乾淨磁罐中盛之或銅器亦可每取少許點

之一方爲細末點。

陰陽翳症

一片如罔翳相連有數圈。二圈虛一圈實兩兩貫相連名

號陰陽翳心堅久始痊

此症黑睛上生二翳俱白色一中虛一中實兩翳連環如陰陽之圈若白中略帶焦黃色或純白而光滑沉澀者皆不能去盡若有細細赤絲絆者退尤遲大略此症非心堅耐久不能得其效也宜服

羌活退翳散

羌活 五味子

黃連 當歸酒洗升麻

各二錢 龍膽草酒洗

黃柏酒炒 甘州炙

黃芩炒 赤芍藥 柴胡

黃芪各三錢

防風 一錢五分

煨石膏 三錢五分

右剉細末每服五錢水三盞煎至一半入酒少許微煎去滓臨卧熱服忌言語

瑪瑙內傷症

一障薄而不厚偏斜略帶焦黃此翳最難除盡名爲瑪瑙內傷膏損精傷之症定知有耗神光若要除根淨絕必須術勝青囊

此症薄而圓缺不等其色昏白而帶焦黃或帶微紅但如瑪瑙之狀者是然雖生在黑輪上實是內傷肝膽真氣精液損壞結成此翳最不能治盡或先有重病過後結成者久久耐心醫治方可得減薄但要除盡必不能矣宜服補肝丸

補肝丸

審視瑤函

卷之三

三

蒼朮

米泔水製

熟地黃

焙乾

蟬退

車前子

川芎

當歸身

連翹

夜明砂

羌活

龍膽州

酒洗

菊花

各等分

右爲細末米泔水煮猪肝搗爛入末爲丸如桐子大每服五十九薄荷湯送下

聚星障症

此症異他翳團圓不放開分明星數點怕熱眼多淚四圍有瘀滯變出聚星來

此症黑睛上有細顆或白或微黃色但微黃者急而變重或連綴或團聚或散漫或齊起或先後逐漸杜生翳起者易治生定者退遲能大者有變團聚生來而作一

地者有凝脂之變連輟四散傍風輪白際起變大而接連者花翳白陷也若兼赤脉痕絆者退遲若星翳生於絲盡頭者不惟退遲亦且變重大抵此症多病於痰火水虧能保養者庶幾斷喪犯戒者變症生焉宜服海藏地黃散

海藏地黃散治大小男婦心肝壅熱目赤譫語生赤翳或白膜遮睛四邊散漫者酌一治者暴遮誤睛者多失明宜速用此方亦治痘瘡八月

大黃煨 熟地黃 玄參 沙苑蒺藜 防風 穀精艸

黃連酒洗 白蒺藜剉去刺 犀角銼末 生地黃 蟬退去頭足

木賊艸 甘艸剉 則老活 木通 當歸身各等分

右爲細末每服二錢用羊肝煮湯調下

垂簾障症

垂簾明道遺其障從上生淹延年月久混障始漫睛有犯
遭瘀滯方纔變赤睛數般相似症辨別要分明

此症生於風輪從上邊而下不論厚薄但在外色曰者
方是若紅赤乃變症非本病也有初起水膏不清而使
成此症者有起先色赤退後膏濫結爲此症者因其自
上而下如簾垂下故得其名有症數般相似緩者不同
治亦各異不可誤認又努肉初生亦在風輪上起但色
如肉且橫厚不同一偃月侵睛俱風輪起乃氣輪膜內

垂下。白色而薄。與此在外有形者不同。一赤膜下垂。與
瘀滯火實之急者不同。此症只是白障慢慢生下來而
為混障者。間有紅赤。或微紅而已。因其觸犯搏動其火
方有變症。其病從上而下。本稱為順。何以稱逆。此指火
而言。蓋火性木上炎。今下垂。是逆其道矣。故稱曰逆焉。
宜服點。

天麻退翳散

治昏暗
失明

白殭蚕

熱水泡去
絲並汁炒

當歸身

酒洗炒

防風

石決明

醋

白芷

熟地黃

酒炒
烘乾

黃芩

炒

木賊艸

枳殼

炒

麥門冬

去心
焙乾

羌活

白蒺藜

刺炒
去刺

川芎

荆芥穗

菊花

蔓荊子

蟬退足去頭 赤芍藥 天麻炒 蜜蒙花名等分

右為細末每服二三錢燈心湯調下。眼紅加黃連酒洗炒

捲簾散治新舊病眼昏澀難開翳障遮睛或成努肉連眼赤爛常多冷淚或暴發赤眼腫痛

蘆甘石四兩搗碎 玄明粉五錢入荷 川黃連七錢搗碎以水

濾出淨用

右先將蘆甘石末入煬銅罐內開口煨紅令外有霞色為度次將黃連玄明粉水中浸飛過候乾又入黃連湯內再飛過再候乾次入

銅青一兩 白丁香另研 乳香另研 青鹽另研 膽礬另研 鉛另研 白霜另研

一 臟粉另研 硫砂另研 白礬半生 川黃連研為細末
右共研極細末。同前藥再研勻。每用少許。點於眼翳處。每日點二三次。宜久閉為妙。

逆順障症

有障名逆順。淚出且睛疼。上下圓將至。中間未掩睛。若不乘時治。遮滿失光明。

此症色赤而障及絲脉赤虵縱橫。上下兩邊往來。若是色白不變者。乃治後凝定。非本症生來。如是治之。亦不同。若色浮嫩而大。或微黃色者。又非此症。乃花翳白陷也。凡是風輪際處由白睛而來。簾細不等。赤脉週圍圈。

圓侵入黑睛上障起昏澀者。卽此症必有瘀滯在內。蓋滯於左則從左而來。右則從右而來。諸脉絡皆有所滯。則四圍而來。胞雖不赤腫。珠雖不障疼。亦有瘀滯在內。不可以爲輕視。若傷於膏水者。則有翳嫩白大而變爲花翳。白陷若燥澀甚者。則下起一片變爲黃膜上衝之病。若頭疼珠痛脹急其症又重而急矣。宜服羚羊角飲子。

羚羊角飲子

羚羊角

銼末

犀角

銼末

防風

桔梗

羌蔚子

玄參

知母

大黃

炮

決明

甘草

減

黃芩

炒

車前

各等分

右劉薊白水二鍾煎至八分去滓食後溫服

混睛障症

混障却分紅白有餘不足之災紅速白遲皆退久而點服方開紅畏紫筋爬定白嫌光滑如苔帶此兩般症候必然難退易來

此症謂漫珠皆一色之障世之患者最多有赤白二症赤者嫌其多赤脉白者畏其光滑若遇此症必食發物或用藥發起轉覺昏腫紅赤再用點服愈矣宜服地黃散

地黃散

生地黄 當歸 熟地黄焙 大黃各七錢 谷精艸 黃連

酒炒白茯苓剉去 木通 烏犀角剉細 玄參 木賊艸

羌活 蟬脫尾去頭足 各五錢

右為細末每服二錢煮猪肝或羊肝汁食遠調下

八寶膏

梅花片研細 珍珠研細 水晶研飛 貝齒研飛 各

石決明洗淨 琥珀末 空青研飛 瑪瑙研飛 各

右為一處用水五升入砂鍋內煎至一升再加淨川蜜

一兩復煎至一半為膏後入水片末攪勻候退七日火

氣每日臨睡點之早晨不宜點

努肉攀睛症

努肉之病肺實肝虛其努如肉或赤如朱經絡瘀滯氣血難舒嗜燥恣慾暴怒多之先生上匠後障神珠必須峻伐久治方除

此症多起氣輪有膜如肉或如黃汕至後漸漸厚而長積赤瘀努起如肉故努肉攀睛性燥暴恣嗜辛熱之人患此者多久則漫珠積肉視亦不見治宜峻伐久則自愈若無瘀肉積聚其人白珠尚露者不必用鈎割之治宜服睛

還睛散
文並治眼生翳膜骨溫
淚出瘀血努肉攀睛

龍膽州

酒洗炒

川芎

甘草

草決明

川花椒

菊花

木賊

石決明

煨

野麻子

荊芥

茯苓

楮實子

白蒺藜

杵去刺各等分

共為細末每服二錢食後茶清調下日進三服服一切

雞魚厚味及蕎麥麵等物

吹霞散

專照努肉舉晴星翳外障

白丁香

一錢

白芨

白牽牛

各三錢

右研細膩無聲放舌上試過無滓方收貯每日點三次

重者不出一月全愈輕者朝點暮好

定心丸

石菖蒲

枸杞子

家菊花

各五錢

麥門冬

去心焙乾一兩

遠智肉

二錢五分

明辰砂

研細一錢男八

右爲細末煉蜜爲丸如桐子大每服三十丸食後白滾湯送下

雞冠蜆肉症

蜆肉與雞冠形容總一股多生於胞內後及氣輪間。禍曰火土燥瘀滯血行難久則漫睛珠無光漸漸添。

此二症謂形色相類。經絡相同治亦同法。故總而言之。非三病之同生也。其狀色紫如肉形類雞冠蜆肉者卽是多生眼胞之間。後害及氣輪而盡掩於目治者須宜

早割不然恐病久徒費藥力。即欲割亦無益矣。然目大皆內有一塊紅肉如雞冠。蜆肉之狀。此乃心經血部之英華。不可悞認割之。若悞割輕則損目重則喪命矣。慎之慎之。宜服涼膈清脾飲。

涼膈清脾飲

治脾經蘊熱凝聚而成其患。眼胞內生如鷄冠蜆肉根小頭漸長垂出甚者。眼翻流淚亦

致昏蒙

荆芥穗 石膏 防風 赤芍藥 生地黃 黃芩

連翹 山梔仁 蘇薄荷 甘艸

減半餘各等分

右剉劑白水二鍾燈心三十段煎至八分去滓食遠熱服。

翠雲錠治眼胞內生菌毒。用左手大指用貼於患處。右手塗之。其血自止。

銅綠一錢 杭粉五錢 輕粉一分

右研極細末。用黃連一錢。白粳米百粒。水一盃煎一半。再熬。揀去黃連。和藥作錠。陰乾。臨用。清水磨搽。兼治爛弦風。或暴赤腫痛者。蘸搽更妙。

魚子石榴症

魚子石榴之症。世人罕見。斯災魚子一宗而起。石榴四角而來。俱是脾肺積毒。必須剗割方開。

此二症經絡治法相同。總而言之。亦非二病。同生魚子。

障非聚星之比。又非玉粒之患。此其狀一片。外面纍纍。紫翠而生。或淡紅。或淡白色。狀如榴子。綻露於房。其病紅肉。顯或四或六或八。四角生來。障滿睛眇。視亦不見。以上二症。俱是血部瘀實之病。目疾之惡症。治須用割。割後見三光者。方可。若膜黑者。必瞳神有損。不必治之。如畏刺割者。以散服點之。

抽風湯

防風

立明粉

柴胡

大黃

黃芩

車前子

桔梗

細辛

各等分

右剉。剉白水二鍾煎至一鍾。去滓。食後溫服。

化廣散

白丁香五粒 淨朴硝少許 礞砂二分 水片少許
右研極細膩無聲者點之